

Hospital de la Mujer de Carolina del Norte
Estudios de Laboratorio Prenatales Rutinarios

Esta tabla da información sobre las pruebas de laboratorio que se hacen rutinariamente durante el embarazo.

Primeras visitas prenatales

Grupo Sanguíneo	Algunos grupos sanguíneos maternos son asociados con riesgos para el bebé
Identificación de Anticuerpos Sanguíneos	Identificar la exposición pasada a grupos sanguíneos diferentes a los de la madre que podrían poner al bebé en riesgo de conteo sanguíneo bajo.
Inmunidad a la Rubéola	Infectarse con rubéola durante el embarazo pudiera ser dañino para el bebé; si la mujer no es inmune a la rubéola, por lo tanto nosotros recomendamos la vacuna de la rubéola pospartum (después del parto).
Antígeno de superficie para la hepatitis B (HBSAg)	Niños de portadoras crónicas de Hepatitis B pueden tener inmunizaciones especiales al nacer para evitar infecciones de hepatitis.
Conteo Globular Completo (CBC)	Para estar seguro de que la mamá no está anémica
Cultivo de Orina	Infecciones del tracto urinario pueden aumentar el riesgo del embarazo
Pruebas de VIH: Recomendadas (necesita firmar forma de consentimiento)	Identificar a las mujeres infectadas con VIH para poder darle tratamientos para evitar que el bebé sea infectado.
Prueba de Sífilis	Identificar a las mujeres con sífilis para poder tratar la infección y evitar que el bebé sea infectado. Ley Estatal
PRUEBAS HECHAS DURANTE LA PRIMERA EXAMINACIÓN PÉLVICA Y CON ESPÉCULO	
Papanicolaou	Se le hace si no se le ha hecho uno en un año. Prueba de detección para cáncer cervical
Cultivo de Gonorrea	Prueba de detección para infecciones asintomáticas. Si es tratada disminuye el riesgo de que el bebé sea infectado y de tener parto prematuro. Ley Estatal
Clamidia PCR	Prueba de detección para infecciones asintomáticas. Si es tratada disminuye el riesgo de que el bebé sea infectado y de tener parto prematuro. Ley Estatal

Pasar la página para pruebas que se ofrecen cuando el embarazo esté más avanzado

Pruebas que se ofrecen cuando el embarazo esté más avanzado

Pruebas de detección del suero materno (necesita firmar consentimiento informativo)	15-18 semanas (opcional)	ALFA FETOPROTEÍNA (AFP), ESTRIOL, GONATROPINA CORIÓICA HUMANA (hCG) ofrecidas para detectar defectos de nacimiento como defecto de tubo neural abierto, síndrome de Down.
Prueba de detección de Diabetes	Pacientes de alto riesgo-Primer trimestre Rutina- 28semanas	Aumenta el riesgo de desarrollar diabetes en el embarazo
Sífilis	28 semanas	Ley Estatal
Gonorrea	36 semanas	Ley Estatal
Clamidia	36 semanas	Ley Estatal
Estreptococo Grupo B	36 semanas	Prueba para detectar los portadores de Estreptococo Grupo para impedir infección en el neonato(recién nacido)
Repetir los anticuerpos sanguíneos	Para mujeres Rh negativo	Para guiar el uso de rhogan para prevenir la enfermedad Rh en el recién nacido