



A usted se le programó una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada (ERCP, por sus siglas en inglés) en UNC Hospital. Por favor lea atentamente la siguiente información.

### ¿Qué es una ERCP?

La ERCP le permite al médico inyectar un medio de contraste en los conductos biliares y pancreáticos a través del uso de un endoscopio flexible que tiene una pequeña cámara. Luego se saca una radiografía de los conductos biliares y pancreáticos. Este procedimiento proporciona información importante que se usa para proporcionar un tratamiento específico. En algunos casos la terapia puede administrarse directamente a través del endoscopio.

### ¿Cómo debo prepararme para una ERCP?

#### 7 DÍAS ANTES DE LA ERCP:

- Debe dejar de tomar medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (por ejemplo, ibuprofeno) y aspirina *a menos que* se los haya recetado el médico.
- Si toma *Plavix* (Clopidogrel), *Coumadin* (Warfarin) u otro medicamento anticoagulante de la sangre, pregunte a su médico qué debe hacer.

#### 1 DÍA ANTES DE LA ERCP:

- Si usted tiene diabetes, le recomendamos que solo use la mitad de la dosis de insulina de acción prolongada (por ejemplo, *Lantus*) la noche antes de la endoscopia.
- **NO coma ningún alimento sólido después de las 11:59 p. m. de la noche antes de la ERCP.**

#### DÍA DE LA ERCP:

- **Qué debe comer:** no podrá comer ningún alimento, chupar caramelos ni mascar chicle hasta después de finalizada la ERCP.
- **Qué debe beber:** solo podrá beber agua, café negro (sin azúcar, leche ni crema), jugo de manzana, refrescos o agua con gas. Deje de beber estos líquidos al menos 3 horas antes de la ERCP.
- **Medicamentos:** NO tome ningún medicamento para la diabetes, diuréticos (como Lasix / furosemide) o medicamentos para la presión arterial que terminen en «-pri» o «-artan». Usted puede tomar sus otros medicamentos con una pequeña cantidad de líquido hasta cuatro horas antes de la ERCP.
- **Qué debo llevar:** por favor, traiga su tarjeta del hospital y una lista de los medicamentos que esté tomando.

- **Llegue por lo menos 60 minutos antes de la hora de la cita.** Lo debe acompañar un adulto que lo pueda llevar a su casa después de la prueba. **El examen no se llevará a cabo a menos que una persona mayor de 18 años de edad venga con usted y permanezca en la sala de espera del sector de Gastroenterología durante el examen.**
- Esté preparado para pasar entre 2 y 3 horas en la unidad de gastroenterología.

Después de la ERCP:

Una vez finalizado el examen, permanecerá bajo observación en el área de recuperación durante 30 minutos. Antes de salir, el médico le explicará a usted y a la persona que vino con usted los resultados del examen y las instrucciones que debe seguir. Uno de cada diez pacientes será hospitalizado después de una ERCP para su posterior tratamiento.

La persona que vino con usted debe firmar su salida y llevarlo a casa o ir con usted en la furgoneta de pasajeros, autobús o taxi. Usted no podrá conducir o volver a trabajar por lo menos durante 12 horas después de salir del hospital.

**Si tiene alguna pregunta o necesita cambiar la cita del estudio, por favor llame al 919-966-5563.**

**Si tiene una pregunta urgente fuera del horario de atención, por favor envíe un mensaje al gastroenterólogo especialista en formación (*GI Fellow*) de turno al 919-966-4131.**