

关于前列腺癌检测

诊断前列腺癌时，医疗人员会通过血液检测来测量您的前列腺特异性抗原（PSA）水平。前列腺活检（组织取样）是确诊前列腺癌的唯一方法。如果您的PSA水平较高，医疗人员可能会建议进行活检。

需要注意的是，PSA检测也可用于筛查其他前列腺疾病。若您出现泌尿系统症状（如排尿困难），医疗人员可能会通过PSA检测来评估前列腺健康状况。请注意，排尿异常可能由多种原因引起，并不一定是前列腺癌所致。

前列腺癌的高危人群有哪些？

若您是非裔美国人，或您的一级亲属（父亲、兄弟或儿子）曾确诊前列腺癌，则您患病风险较高——尤其当亲属在较年轻时（55岁以下）发病，或家族中有多代人患病时。建议您与主治医生详细探讨前列腺癌筛查的利弊。



前列腺癌筛查 适合您吗？

本信息由美国泌尿外科协会（American Urological Association）及泌尿护理基金会（Urology Care Foundation）提供。欲了解更多信息，请访问：

www.AUAnet.org/PCaToolkit



American
Urological
Association

Urology Care
FOUNDATION™
The Official Foundation of the
American Urological Association



American
Urological
Association

Urology Care
FOUNDATION™
The Official Foundation of the
American Urological Association

男性必须了解的前列腺癌 关键信息

前列腺癌是男性中发病率第二高的癌症，也是导致男性因癌症死亡的第二大原因。平均每六位男性中就有一位会在一生中被确诊。非裔美国男性及有前列腺癌家族史的男性患病风险更高。

与其他癌症不同，前列腺癌通常进展缓慢且可能不会引发健康问题。2012年，全美超过24万男性确诊患前列腺癌，但其中仅约2.8万人因此病去世。许多前列腺癌患者若不接受筛查，可能终生都不会察觉患病。

请访问
www.AUAnet.org/PCaToolkit
获取更多资料


那些人需要做前列腺癌筛查吗？

美国泌尿外科协会(AUA)近期更新了前列腺癌检测指南。右侧图表依据最新指南制作，可帮助您判断是否需要进行前列腺癌检测。

PSA检测的益处

- PSA检测结果正常可让您安心
- PSA 检测有助于在癌细胞扩散前及早发现前列腺癌
- 早期治疗前列腺癌可能有助于部分男性避免因癌症引起的问题。
- 早期治疗前列腺癌可能有助于部分男性延长寿命。

哪些人适合前列腺癌筛查？



PSA检测的可能风险

- 常规PSA检测可能漏诊部分前列腺癌（即"假阴性"结果）。
- 检测结果可能出现误判（即"假阳性"），造成不必要的心理负担。
- 假阳性结果可能导致非必要的前列腺穿刺活检（组织取样）。
- 高PSA值检出的前列腺癌可能发展缓慢，终生不会引发临床症状
- 前列腺癌治疗可能导致勃起功能障碍、尿失禁与肠道功能异常的副作用。
- 根据美国泌尿外科学会指南，无症状男性中，常规筛查对55-69岁群体的益处最大。55岁以下或69岁以上具风险因素的男性，应咨询医生评估筛查的必要性。